ANSM - Mis à jour le : 05/01/2026

Dénomination du médicament

HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire)
Hexacétonide de triamcinolone

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire) et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire) ?
3. Comment utiliser HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire) ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire) ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire) ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique : GLUCOCORTICOIDE - code ATC: H02AB08

Ce médicament est un corticoïde.

Il est utilisé en injection intra-articulaire en rhumatologie dans les arthrites inflammatoires (formes adultes, arthrite juvénile idiopathique chez le nourrisson âgé d'au moins 1 an, chez l'enfant et l'adolescent), et dans l'arthrose en poussée.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire) ?

N'utilisez jamais HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire) :

- en cas d'infection locale ou générale ou suspicion d'infection,
- si vous êtes allergique à la triamcinolone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- en cas de troubles de la coagulation, traitement anticoagulant en cours,
- en cas d'injection par voie intra-discale,
- en cas d'injection dans les tissus mous (tendons, enthèses),
- chez le nouveau-né (jusqu'à 4 semaines) sauf recommandation contraire de votre médecin, en raison de la présence d'alcool benzylique,
- pendant plus d'une semaine chez les jeunes enfants (moins de 3 ans), sauf avis contraire de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire).

Contactez votre médecin en cas de vision floue ou d'autres troubles visuels.

Faites attention avec HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire):

Mises en garde spéciales

Le rapport bénéfice/risque devra être soigneusement évalué avant toute administration d'HEXATRIONES chez l'enfant de moins de 3 ans, compte tenu de la présence d'alcool benzylique pouvant induire des réactions toxiques, du fait d'un tropisme neurologique éventuel.

La corticothérapie peut favoriser la survenue de diverses complications infectieuses. En conséquence, avant le traitement, vous devez prévenir votre médecin en cas de vaccination récente et de maladies virales en évolution (hépatite virale, herpès, varicelle, zona), ou si des douleurs ou une fièvre apparaissent après l'injection.

Les injections répétées risquent d'entraîner des symptômes cliniques et biologiques d'hypercorticisme (prise de poids, gonflement, hypertension) et de déséquilibrer un diabète, des troubles mentaux ou une hypertension artérielle sévère.

Les corticoïdes oraux ou injectables peuvent favoriser l'apparition de tendinopathie, voire de rupture tendineuse (exceptionnelle). Prévenir votre médecin en cas d'apparition de douleur tendineuse.

Le traitement concomitant de corticoïdes oraux ou injectables avec certains médicaments pouvant augmenter les effets d'HEXATRIONE (y compris certains médicaments contre le VIH: ritonavir, des médicaments contenant du cobicistat) n'est pas recommandée.

Précautions d'emploi

Ce médicament ne doit pas être injecté dans les tissus mous (tendons, enthèses).

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire)

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Certains médicaments peuvent augmenter les effets d'HEXATRIONE et votre médecin doit vous surveiller attentivement si vous prenez ces médicaments (y compris certains médicaments contre le VIH : ritonavir, des médicaments contenant du cobicistat).

Informez votre médecin si vous vous prenez, en particulier:

- des antibiotiques de la famille des fluoroquinolones,
- l'aspirine à fortes doses ou aux doses habituelles,
- des anti-inflammatoires non stéroïdiens,
- des anticoagulants oraux,
- autres anticoagulants (héparines),
- des médicaments pouvant diminuer l'efficacité d'HEXATRIONE (comme les anticonvulsivants),
- des médicaments faisant baisser le taux de potassium,
- des médicaments utilisés dans le traitement de l'hypertension,
- des digitaliques,
- des médicaments pouvant donner certains troubles du rythme cardiaque.

Médicaments pour traiter les infections fongiques (kétoconazole): Les effets stéroïdiens de l'hexacetonide de triamcinolone peuvent être augmentés.

Inhibiteurs de protéase pour traiter l'infection par le VIH (ritonavir): Les effets des stéroïdes peuvent être accrus ou prolongés. Il s'agit notamment du syndrome de Cushing (taux élevé d'une hormone appelée cortisol avec des symptômes tels que la prise de poids, une peau fine et un visage "lunaire") et des glandes surrénales peu actives.

HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire) avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

La prise d'HEXATRIONE au cours de la grossesse et de l'allaitement n'est pas sans risque. HEXATRIONE ne sera utilisé pendant la grossesse et l'allaitement qu'en cas de nécessité.

En cas de traitement à doses importantes et de façon chronique, l'allaitement est déconseillé.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

Sportifs

Cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire) contient de l'alcool benzylique

Ce médicament contient 9 mg d'alcool benzylique par ml de suspension injectable.

L'alcool benzylique peut provoquer des réactions allergiques.

L'alcool benzylique est associé à un risque d'effets secondaires graves y compris des problèmes respiratoires (appelés « syndrome de suffocation ») chez les jeunes enfants. Ne pas utiliser pendant plus d'une semaine chez les jeunes enfants (moins de 3 ans), sauf avis contraire de votre médecin ou de votre pharmacien.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous souffrez d'une maladie du foie ou du rein. De grandes quantités d'alcool benzylique peuvent s'accumuler dans votre corps et entraîner des effets secondaires (appelés « acidose métabolique »).

HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire) contient du sorbitol

Ce médicament contient 644 mg de sorbitol par ml de suspension injectable. Le sorbitol est une source de fructose. Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) présentiez une intolérance à certains sucres ou si vous avez été diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose (IHF), un trouble génétique rare caractérisé par l'incapacité à décomposer le fructose, parlez-en à votre médecin avant que vous (ou votre enfant) ne receviez ce médicament.

HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire) contient du sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par ml de suspension injectable, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. COMMENT UTILISER HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire) ?

Posologie

Adulte: La posologie varie de 0,5 à 2 ml de suspension selon la taille de l'articulation soit 10 à 40 mg d'hexatrione de triamcinolone, sans dépasser deux ampoules de 40 mg.

Enfant: la dose usuelle recommandée est de 5 mg (0,25 ml) à 40 mg (2 ml) par injection. Ne pas dépasser 40 mg par injection.

Suivre la prescription de votre médecin.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE

Mode et voie d'administration

VOIE INTRA-ARTICULAIRE STRICTE

Fréquence d'administration

Suivre la prescription de votre médecin.

Durée du traitement

Elle est déterminée par votre médecin.

Si vous avez utilisé plus de HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire) que vous n'auriez dû

Sans objet.

Si vous oubliez d'utiliser HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire)

Sans objet.

Si vous arrêtez d’utiliser HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire)

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effet indésirable rare (peut affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

- vision floue

Effets indésirables de fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :

- risques locaux: infection, inflammation ou calcifications de l'articulation,
- quelques cas de ruptures tendineuses ont été décrits de manière exceptionnelle, en particulier en co-prescription avec les fluoroquinolones,
- maux de tête et bouffées de chaleur peuvent survenir. Ils disparaissent habituellement en un ou deux jours,
- fragilisation de la peau,
- les injections répétées risquent d'entraîner des symptômes d'hypercorticisme (prise de poids, gonflement) et de déséquilibrer un diabète, une hypertension artérielle,
- réactions allergiques locales et générales.
- irrégularités menstruelles, aménorrhée, hémorragies post ménopausiques
- hypopigmentation de la peau, hyperpigmentation de la peau

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: https://signalement.social-sante.gouv.fr/

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire) ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Après ouverture: le produit doit être utilisé immédiatement.

A conserver à une température inférieure à 30°C et à l'abri de la lumière.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire)

- La substance active est :

Hexacétonide de triamcinolone..... 2,0 g

Pour 100 ml.

- Les autres composants sont :

Alcool benzylique, polysorbate 80, sorbitol à 70 p. 100 (cristallisable), acide chlorhydrique dilué ou hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

Qu’est-ce que HEXATRIONE 2 POUR CENT, suspension injectable (intra-articulaire) et contenu de l’emballage extérieur

Suspension injectable en ampoule de 1 ml ou 2 ml.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché

ETHYPHARM
194, BUREAUX DE LA COLLINE, BÂTIMENT D
92213 SAINT-CLOUD CEDEX

Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché

LABORATOIRES ETHYPHARM
179 BUREAUX DE LA COLLINE
92210 SAINT-CLOUD

Fabricant

FISIOPHARMA S.R.L.
NUCLEO INDUSTRIALE
84020 PALOMONTE (SA)
ITALIE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

A compléter ultérieurement par le titulaire

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).